




ÉVALUATION NATIONALE DENTIBIORESIST

Suivi sept. 2018 à déc. 2023

DENTIBIOREST : PRESCRIRE MOINS, PRESCRIRE MIEUX LES PREMIERS RÉSULTATS DE VOTRE RÉGION

L'antibiorésistance et les chirurgiens-dentistes

L'antibiorésistance ne cesse de progresser dans le monde. La France est l'un des pays d'Europe les plus consommateurs d'antibiotiques, notamment en ville. Les chirurgiens-dentistes sont les deuxièmes prescripteurs d'antibiotiques en France dans ce secteur (derrière les médecins généralistes) et sont responsables de **13% de ces prescriptions**.

Améliorer les prescriptions des chirurgiens-dentistes

Dans ce contexte, nous avons proposé une action dans le Grand Est dès 2020, baptisée DentibioRésist. Elle vise à améliorer les prescriptions des chirurgiens-dentistes en termes d'indications de prescription, de choix de molécule antibiotique et de durée de traitement.

Une action collective

Ces travaux ont été portés par un collectif : le CRATB (Centre régional antibiothérapie), les Universités d'odontologie du Grand Est (Nancy, Reims et Strasbourg), du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'Assurance maladie. Rapidement les résultats ont été mesurables par des changements de pratiques des chirurgiens-dentistes.

L'accompagnement a été généralisé à toutes les régions en 2023.

Les données de votre région sont retranscrites dans ce document. Globalement ces résultats sont positifs et encourageants et montrent qu'un accompagnement collectif puis individuel peut faire bouger les pratiques de prescription. Les chirurgiens-dentistes se sentent concernés et s'impliquent.

Poursuivons les efforts, pour prescrire moins et prescrire mieux.

1 MÉTHODE D'ÉVALUATION

VISUEL DU PROFIL INDIVIDUEL DE PRESCRIPTION DES CD



1 MÉTHODE D'ÉVALUATION

INDICATEURS DE PERTINENCE SUIVIS

Suivi des trois indicateurs de pertinence des prescriptions d'antibiotiques des chirurgiens-dentistes omnipraticiens

Période sept 2018 à déc 2023

Profils toutes les régions

Ces indicateurs sont exprimées en nombre de consommateurs (NBC) :

un consommant = un individu qui a bénéficié d'un remboursement d'une spécialité donnée pendant la période considérée, ici le mois (il n'est compté qu'une fois s'il a plusieurs remboursements de la même spécialité durant cette période). Pour les antibiotiques, médicaments de prescription ponctuelle, cette unité est quasi équivalente au nombre de prescriptions.

1 LES PARTS RESPECTIVES DES PRESCRIPTIONS D'AMOXICILLINE ET DE L'ASSOCIATION AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE

INDICATEUR 1 = nombre de consommateurs* d'amoxicilline / nombre de consommateurs* d'amoxicilline-acide clavulanique

La cible visée : 10 (les prescripteurs devraient prescrire 10 fois plus d'amoxicilline que d'association amoxicilline/acide clavulanique, antibiotique de 2^{ème} intention).

2 LA PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS EN ODONTOLOGIE : ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE

INDICATEUR 2 = nombre de consommateurs* des ATB peu recommandés / total NBC ATB

La cible visée : < 5 % (ces antibiotiques de 2^{ème} intention, ne devraient pas représenter plus de 5 %, des antibiotiques).

3 LA PART DES ANTIBIOTIQUES NON RECOMMANDÉS

INDICATEUR 3 = nombre de consommateurs* ATB non recommandés / Total NBC ATB

La cible visée : < 1 % (ces antibiotiques ne devraient pas être utilisés en odontologie).

L'indicateur 3 étant atteint dans toutes les régions, les visuels ne seront pas présentés ici.

SOURCE DES DONNÉES


Données mensuelles extraites de la base de données Open Medic : Classe ATC : J01% + P01AB01 (métronidazole) - Libellé classe ATC (= dénomination commune du médicament) - Code CIP 13 - Libellé code CIP (= nom de la spécialité) - Nombre de consommateurs - Base de remboursement - Montant remboursé - Nombre de boîtes - Région

2 RÉSULTATS

UNE TEMPORALITÉ DE L'ACTION DIFFÉRENTE SELON LES RÉGIONS

Toutes les régions n'ont pas mené l'action dans la même temporalité :


Le degré d'avancement de la campagne d'échange peut être différent selon les régions.



GRAND EST

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



GRAND EST

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



NOUVELLE AQUITAINE

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



NOUVELLE AQUITAINE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



HAUTS DE FRANCE

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



HAUTS DE FRANCE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



ILE DE FRANCE

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



ILE DE FRANCE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



PAYS DE LOIRE

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



PAYS DE LOIRE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



OCCITANIE

INDICATEUR 1


AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



OCCITANIE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



AURA

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



AURA

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



CENTRE VAL DE LOIRE

INDICATEUR 1


AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



CENTRE VAL DE LOIRE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



BRETAGNE

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



BRETAGNE

INDICATEUR 2

PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



NORMANDIE

INDICATEUR 1


AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



NORMANDIE

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



PACAC

INDICATEUR 1


AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



PACAC

INDICATEUR 2


PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

INDICATEUR 1


AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

INDICATEUR 2

PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))



OUTRE MER

INDICATEUR 1

AMOXICILLINE/ AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE (EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE : >10)



OUTRE MER

INDICATEUR 2

PART DES ANTIBIOTIQUES PEU RECOMMANDÉS (ASSOCIATION SPIRAMYCINE/MÉTRONIDAZOLE, PRISTINAMYCINE, DOXYCYCLINE, EN NOMBRE DE CONSOMMANTS (CIBLE < 5%))

