

**MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ**

DATE : 19/05/2022

REFERENCE : [CORRUSS] MARS N°2022-21

OBJET : CAS GROUPES D'INFECTIONS AUTOCHTONES PAR LE VIRUS MONKEYPOX EN EUROPE

Pour action

☐ Établissements médico-sociaux

☒ Établissements hospitaliers

Pour information

☒ DGOS

☒ ARS

☒ SpF

☒ DGCS

☒ ARS de Zone

☒ ANSM

☐ Autre :

A destination principale des services d'urgence, des SAMU, des services de maladies infectieuses, des services de dermatologie et des services d'hygiène hospitalière des établissements de santé

Mesdames, Messieurs,

Plusieurs cas d'infections autochtones à Monkeypox (MKP) ont récemment été signalés dans plusieurs pays d'Europe, par le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, la Suède et l'Italie, notamment chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Des cas suspects sont en cours d'investigation dans de nombreux pays. Il s'agit d'un phénomène inhabituel.

Un premier cas suspect a été signalé ce jour en Ile-de-France.

Pour l'ensemble des cas confirmés, les analyses ont mis en évidence un virus appartenant au clade "Afrique de l'ouest" du virus MKP¹, suggérant un lien initial avec le Nigéria, pays dans lequel le virus circule régulièrement depuis 2017. Hormis le cas signalé au Royaume-Uni le 7 mai dernier importé du Nigéria, les nouveaux cas signalés ne rapportent pas de voyage en Afrique ou de lien avec une personne au retour d'Afrique. A ce stade, les cas rapportés sont majoritairement bénins, et il n'y a pas de décès signalé.

Après une période d'incubation pouvant aller de 5 à 21 jours, l'infection débute par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une asthénie. La maladie provoque également des ganglions. Les adénopathies (cou, face...) sont volumineuses. La personne est contagieuse dès l'apparition des premiers symptômes.

Dans les 1 à 3 jours (parfois plus) suivant l'apparition de la fièvre, le patient développe une **éruption cutanée**, qui commence souvent sur le visage puis peut s'étendre à d'autres parties du corps, **dont les paumes des mains, les plantes des pieds et les organes génitaux**. Les autres muqueuses (ORL, conjonctives) peuvent également être concernées. Il convient de noter que les cas récemment détectés chez les HSH ont signalé une prépondérance de lésions dans la région génitale.

¹ Le virus MKP est un orthopoxvirus, dont deux clades principaux sont connus : Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale (bassin du Congo).

L'atteinte cutanée survient en une seule poussée. Les lésions passent par différents stades successifs (macule, papule, vésicule, pustule puis croûte), et évoluent de façon uniforme. Lorsque les croûtes tombent, les personnes ne sont plus contagieuses. La maladie dure généralement de **2 à 3 semaines**.

L'atteinte cutanée de l'infection par le Monkeypox se différencie de celle de la varicelle (peu fréquente chez l'adulte). Pour la varicelle, l'éruption évolue en plusieurs poussées. Les paumes des mains et les plantes des pieds sont épargnées.

La transmission du virus Monkeypox se produit lorsqu'une personne entre en contact avec un animal (rongeurs notamment), un être humain ou des matériaux contaminés par le virus. Le virus pénètre dans l'organisme par une lésion de la peau (même non visible), des voies respiratoires ou des muqueuses. La transmission de l'animal à l'homme peut se faire par morsure ou griffure, par la préparation de viande de brousse, par contact direct ou indirect avec des fluides corporels ou du matériel de lésion. Il n'y a pas habituellement d'animaux réservoirs présents en Europe. La **transmission interhumaine** peut se faire par les **gouttelettes respiratoires**, qui ne peuvent généralement pas se déplacer à plus de quelques mètres, ce qui nécessite un **contact prolongé face à face**. Les autres modes de transmission interhumaine comprennent le **contact cutané direct avec les liquides biologiques ou la lésion**, et le contact indirect avec la lésion, par exemple par des vêtements, du linge de maison ou de la vaisselle contaminés.

Dans ce contexte, **la vigilance est requise devant tout cas évocateur**. Des patients pourraient se présenter dans les services d'urgence des établissements de santé. **Les mesures de protection (précautions complémentaires air et contact) et d'hygiène devront être mises en place dans les services accueillant ces patients, aux urgences et dans les services de maladies infectieuses, et dans les autres structures pouvant accueillir ces patients (CeGIDD...).**

Hormis les patients avec des formes graves, les patients immunodéprimés et les très jeunes enfants pour lesquels il conviendra d'être particulièrement vigilant ou les autres situations à évaluer au cas par cas avec le médecin en charge du patient et l'infectiologue référent, les cas de Monkeypox ne nécessitent pas d'hospitalisation. **Les patients avec des formes graves seront adressés en première intention dans les établissements de santé de référence (ESR) REB.**

Il est important de veiller à assurer la **permanence d'un infectiologue référent au sein de chaque établissement de santé de référence (ESR)**, pour aider les médecins de ville et les régulations des SAMU Centre 15 à classer les cas, organiser les prélèvements et orienter les prises en charge (cf. circuit de prise en charge des patients et prélèvements en annexe).

Pour rappel, l'infection à Monkeypox est une **maladie à déclaration obligatoire** au même titre que les autres orthopoxviroses. En complément de la DO, les premiers cas suspects devront être signalés sans délai à l'Agence régionale de santé de votre région.

Santé publique France a élaboré une **définition de cas et une conduite à tenir pour la recherche des personnes contacts**, disponible sur le site de Santé publique France (<https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/maladies-a-declaration-obligatoire/definition-de-cas-cat-monkeypox>).

La mission nationale COREB (Coordination Opérationnelle Risque Épidémique et Biologique) a également rédigé une **fiche réflexe pour la prise en charge médicale des cas et les mesures de protection à adopter** (<https://www.coreb.infectiologie.com/fr/monkeypox.html>).

Cette situation sanitaire étant **inédite et évolutive**, ces documents de conduite à tenir sont susceptibles d'être régulièrement actualisés.

Je vous remercie de votre mobilisation.

Pr. Jérôme SALOMON
Directeur général de la santé

Signé

Annexe : circuit de prise en charge des patients et des prélèvements

- Les personnes avec des symptômes évocateurs d'une infection à Monkeypox, notamment des éruptions cutanées, peuvent appeler le SAMU-Centre 15 pour être orientées.
- Les professionnels de santé de ville qui reçoivent des patients avec des symptômes évocateurs d'une infection à Monkeypox peuvent également appeler le SAMU-Centre 15 pour être appuyés dans la prise en charge de leurs patients, si nécessaire.
- Les régulations des SAMU-Centre 15 sont en lien avec les infectiologues référents pour classer le cas et, pour les cas suspects ou probables, organiser leur prise en charge. Des téléconsultations pourront ainsi être organisées, si nécessaire.
- Les prélèvements sont à organiser par ordre de priorité dans les établissements de santé de référence (ESR), en établissement de santé de proximité ou en ville (si l'ESR est trop éloigné du domicile du patient).
- Des consignes devront être données aux patients pour leur transport vers le lieu de prélèvement : privilégier un véhicule personnel, faire appel à une ambulance, utilisation des transports en commun à éviter.
- Les prélèvements seront analysés dans les ESR. Les premiers prélèvements seront confirmés par le CNR² des orthopoxvirus.
- Les patients avec des formes cliniques non graves seront isolés à domicile. Un arrêt de travail ou une autorisation à être placé en télétravail pourront leur être délivrées pour respecter cet isolement pendant 3 semaines.
- Une surveillance des patients isolés à domicile devra être mise en place en lien avec les Agences régionales de santé.

² <https://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/les-centres-nationaux-de-reference-cnr/centre-national-de-reference-le-des-orthopoxvirus>