

Recommandations de Pratiques Professionnelles

Société Française d'Anesthésie et de Réanimation



PRECONISATIONS POUR L'ADAPTATION DE L'OFFRE DE SOINS EN ANESTHESIE- REANIMATION DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE DE COVID-19

Version MAI 2020

en association avec les sociétés : ADARPEF, CARO et SFR
Association des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d'Expression Française
Club Anesthésie Réanimation en Obstétrique
Société Française de Radiologie

Texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques (28/04/2020) et le Conseil d'Administration de la SFAR (29/04/2020).

FICHES PRATIQUES

Équipement de protection individuel en fonction des lieux et des actes pour le patient adulte et le personnel soignant.

Mesures de protection	Consultation de pré-anesthésie	Bloc opératoire ou plateau interventionnel	SSPI	Soins continus ou réanimation
POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ	PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT COVID+ OU FORTEMENT SUSPECTÉ			
	Désinfection des mains par SHA et port d'un masque chirurgical II ou IIR et de lunettes de protection. Désinfection des surfaces et du matériel.	Port d'un masque FFP2, d'une charlotte, d'une sur-blouse à manches longues + tablier (ou à défaut d'une casaque chirurgicale), de gants, et d'un écran facial (ou à défaut de lunettes de protection occlusives). Salle COVID-19 dédiée ou identifiée par signalétique apposé sur la porte.	X	Port d'un masque FFP2, d'une charlotte, d'une sur-blouse à manches longues + tablier (ou à défaut d'une casaque chirurgicale), de gants, et d'un écran facial (ou à défaut de lunettes de protection). Port d'un masque ventilé (PAPRs) lors des procédures à haut risque (trachéotomie). Mise en place si possible et patient intubé d'un système d'aspiration clos.
	PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT NON-COVID			
	Désinfection des mains par SHA et port d'un masque chirurgical II ou IIR. Désinfection des surfaces et du matériel.	Intubation et extubation : Port d'un masque FFP2, d'une charlotte, de gants, tablier et d'un écran facial ou de lunettes de protection occlusives.	Si extubation (à éviter en SSPI) : Port d'un masque FFP2, d'une charlotte, de gants, et d'un écran facial ou de lunettes de protection.	Port d'un masque chirurgical II ou IIR. Si exposition aux liquides biologiques : port d'une charlotte et d'un écran facial ou de lunettes de protection. Si manœuvres respiratoires à risque (notamment intubation/extubation, aspiration trachéale, bronchoscopie...) : port d'un masque FFP2, d'une charlotte, de gants, et d'un écran facial ou de lunettes de protection.
POUR LE PATIENT	PATIENT COVID+ OU FORTEMENT SUSPECTÉ			
	Désinfection des mains par SHA et mise en place d'un masque chirurgical II ou IIR.	Départ du service pour le bloc opératoire selon le circuit COVID-19 dédié (ascenseur...) avec un masque chirurgical II ou IIR.	X	Mise en place d'un masque chirurgical II ou IIR.
	PATIENT NON-COVID			
	Désinfection des mains par SHA et mise en place d'un masque chirurgical II ou IIR.	Départ du service pour le bloc opératoire avec un masque chirurgical II ou IIR.	Après l'extubation du patient, remise en place d'un masque chirurgical II ou IIR.	Pas de masque sauf si le patient présente des symptômes compatibles avec une « infection à COVID + », mise en place d'un masque chirurgical II ou IIR.

AUTO-QUESTIONNAIRE



Avez-vous actuellement ou avez-vous eu dans les jours précédents un ou plusieurs des symptômes suivants de façon inhabituelle ?

Symptômes majeurs

- | | |
|--|-----------|
| - Fièvre (température mesurée >38°C) | Oui - Non |
| - Toux sèche | Oui - Non |
| - Difficulté à respirer ou fréquence respiratoire élevée (>20/min) | Oui - Non |
| - Anosmie (perte de l'odorat) | Oui - Non |
| - Agueusie (perte du goût) | Oui - Non |


Symptômes mineurs

- | | |
|---|-----------|
| - Maux de gorge | Oui - Non |
| - Rhinorrhée (« nez qui coule ») | Oui - Non |
| - Douleur thoracique | Oui - Non |
| - Myalgies (« mal dans les muscles », courbatures) | Oui - Non |
| - Altération de l'état général ou fatigue importante | Oui - Non |
| - Confusion (« pensées qui se mélangent », désorientation) | Oui - Non |
| - Céphalées (« maux de tête ») | Oui - Non |
| - Diarrhées | Oui - Non |
| - Nausées et/ou vomissements | Oui - Non |
| - Éruption cutanée ou engelures/crevasses aux doigts ou à la main | Oui - Non |

Avez-vous été en contact étroit (en face à face, à moins d'1 mètre et/ou pendant plus de 15 minutes, sans masque ni pour vous ni pour le contact) **avec une personne atteinte de COVID de façon prouvée au cours des 15 derniers jours ?**

Oui - Non

Algorithme chirurgie PROGRAMMEE




≥1 symptôme majeur et/ou ≥2 symptômes mineurs

1 critère mineur isolé

* selon l'avis du HCSP

** chirurgie thoracique avec résection pulmonaire, chirurgie ORL, chirurgie endo-buccale, neurochirurgie de la base du crâne, bronchoscopie rigide

Algorithme chirurgie en URGENCE



21 symptôme majeur et/ou 22 symptômes mineurs

1 critère mineur isolé

* réveil en salle interventionnelle ou espace dédié de SSPI avec isolement géographique et masque pour le patient

** selon l'avis du HCSP

*** chirurgie thoracique avec résection pulmonaire, chirurgie ORL ou endo-buccale, neurochirurgie de la base du crâne, bronchoscopie rigide

Questionnaire standardisé COVID-19 pédiatrique



Votre enfant présente-il ou a-t-il présenté dans le mois qui précède, un ou plusieurs de ces symptômes de façon inhabituelle

- | | | |
|---|-----|-----|
| • Fièvre (température mesurée $>38^{\circ}$) | oui | non |
| • Toux sèche | oui | non |
| • Difficultés à respirer | oui | non |
| • Maux de gorge | oui | non |
| • Rhinite | oui | non |
| • Douleur dans les muscles (courbatures) | oui | non |
| • Fatigue importante | oui | non |
| • Maux de tête | oui | non |
| • Diarrhées | oui | non |
| • Nausées et/ou Vomissements | oui | non |
| • Anosmie (perte de l'odorat) | oui | non |
| • Agueusie (perte du goût) | oui | non |
| • Signes cutanés
(urticaire, gonflement, rougeur et douleurs au niveau des doigts ...) | oui | non |

Votre enfant a-t-il été en contact avec quelqu'un ayant présenté un des symptômes précédents, ou testé covid positif

oui non


Questionnaire à utiliser

- Lors de la (télé)consultation préanesthésique
- Lors de la visite préanesthésique
- Lors de l'appel à J-1, pour les patients programmés en UCA


Hospitalisation conventionnelle

Algorithme pédiatrique


Hospitalisation conventionnelle



Hospitalisation ambulatoire



Parcours de la consultation d'anesthésie



* RFE Bilan préopératoire et décision vis-à-vis de la chirurgie.


** La téléconsultation doit privilégier la visio, l'appel téléphonique correspond à une situation dégradée et doit être justifiée dans le dossier du patient

**Interactions médicamenteuses possibles entre médicaments utilisés en péri-opératoire
et anti-SARS-CoV-2, d'après <https://www.covid19-druginteractions.org/>**


	Lopinavir / Ritonavir	Remdésivir	Hydroxy- chloroquine	Tocilizumab	Interféron beta
Bupivacaïne	↑	↔	↔	↓	↔
Lidocaïne	↑	↔	↔	↔	↔
Propofol	↓ ♥	↔	↔ ♥	↔	↔
Kétamine	↑	↔	↔	↓	↔
Thiopental	↑	↔	↔	↔	↔
Midazolam IV	↑	↔	↔	↔	↔
Midazolam per os	↑	↔	↔	↔	↔
Sévoflurane	↔ ♥	—	↔ ♥	—	—
Desflurane	↔	↔	↔	↔	↔
Clonidine	↔	↔	↔	↔	↔
Dexmédétomidine	↓ ♥	↔	↔ ♥	↔	↔
Suxaméthonium	↔	↔	↔	↔	↔
Vécuronium	↔	↔	↔	↔	↔
Atracurium	↔	↔	↔	↔	↔
Cis-atracurium	↔	↔	↔	↔	↔
Rocuronium	↑	↔	↔	↔	↔
Fentanyl	↑	↔	↔	↓	↔
Remifentanyl	↔	↔	↔	↔	↔
Sufentanyl	↑	↔	↔	↓	↔
Morphine	↓	↔	↔	↔	↔
Hydrocodone	↓ ↑ ♥	↔	↑ ♥	↔	↔
Codéine	↑	↔	↔	↔	↔
Dextropropoxyphène	↑	↔	↔	↓	↔
Oxycodone	↑ (160%)	↔	↔	↓	↔
Tramadol	↑ ♥	↔	↔ ♥	↔	↔
Paracetamol	↔	↔	↔	↔	↔
Diclofenac	↔	↔	↔	↔	↔
Ibuprofène	↔	↔	↔	↔	↔
Enoxaparine	↔	↔	↔	↔	↔
Dabigatran	↓ ou ↑	↔	↑	↔	↔
Rivaroxaban	↑	↔	↑	↓	↔
Apixaban	↑	↔	↑	↓	↔
Fondaparinux	↔	↔	↔	↔	↔
Héparine	↔	↔	↔	↔	↔
Halopéridol	↑ ♥	↔	↔ ♥	↔	↔
Alprazolam	↑	↔	↔	↔	↔
Bromazépam	↑	↔	↔	↔	↔
Diazépam	↑	↔	↔	↔	↔
Oxazépam	↔	↔	↔	↔	↔
Zolpidem	↑	↔	↔	↔	↔
Hydroxyzine	↑	↔	↔	↔	↔
Droperidol	↑ ♥	↔	↔ ♥	↔	↔
Ondansétron	↑ ♥	↔	↔ ♥	↔	↔
Dexaméthasone	↑ + ⊥	↔	↔	↔	↔

	Interaction significative, association déconseillée
	Interaction possible, ajustement doses ou surveillance conseillés
	Interaction de faible intensité, pas d'ajustement nécessaire
	Pas d'interaction significative
♥	Risque de toxicité cardiaque
↑	Augmentation de l'exposition à la drogue
↓	Baisse de l'exposition à la drogue
⊥	Baisse de l'exposition à l'antiviral
↔	Pas d'effet

Proposition de circuits patient en fonction du statut COVID



Interactions de la cellule de régulation multidisciplinaire



PERSONNES À RISQUE DE DEVELOPPER UNE FORME GRAVE D'INFECTION À SARS-COV-2

Définition selon l'avis émis le 14 mars 2020 par le Haut Conseil de la Santé Publique

- ☐ Personnes âgées de 70 ans et plus
- ☐ Antécédents (ATCD) cardiovasculaires :
 - Hypertension artérielle compliquée
 - ATCD d'accident vasculaire cérébral
 - ATCD de coronaropathie, insuffisance cardiaque stade NYHA III-IV
 - ATCD de chirurgie cardiaque
- ☐ Diabétiques insulino-dépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie
- ☐ Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale
- ☐ Insuffisance rénale chronique dialysée
- ☐ Malades atteints de cancer sous traitement
- ☐ Immunodépression liée à une greffe d'organe solide ou de cellules souches
- ☐ Immunodépression liée à une hémopathie maligne en cours de traitement
- ☐ Immunodépression médicamenteuse :
 - chimiothérapie anti cancéreuse
 - Immunosuppresseur
 - biothérapie
 - corticothérapie à dose immunosuppressive
- ☐ Obésité (indice de masse corporelle $> 35 \text{ kg/m}^2$)
- ☐ Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 $< 200/\text{mm}^3$
- ☐ Cirrhose $\geq$ stade B de la classification de Child-Pugh

¹ https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200314_aprrlpelpecdclprdfs.pdf

² <https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-obesite-covid-19.pdf>

	Spécialité chirurgicale ou interventionnelle	Recommandations pendant l'épidémie de COVID-19	Recommandations après l'épidémie de COVID-19	Lien
Tête et cou	Neuro-chirurgie et rachis	Oui	Non	Société Française de neurochirurgie Pathologies rachidiennes Neurochirurgie pédiatrique Neurochirurgie fonctionnelle Base du crâne Neurochirurgie vasculaire
	Ophthalmologie	Oui	Non	Société Française d'Ophthalmologie
	ORL-Otologie	Oui	En cours	Association Française d'Otologie et Neuro-Otologie Société Française de Chirurgie Oncologique Endoscopies et fibroscopies ORL
	Maxillo- faciale et stomatologique	Non	Non	
Thorax	Thoracique et cardio-vasculaire	Oui	Oui	Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
	Vasculaire et endovasculaire	Oui	Non	Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
	Cardiologie interventionnelle	Oui	Non	Société Française de Cardiologie
	Pneumologie interventionnelle	Oui	Non	Société de Pneumologie de Langue Française
	Radiologie interventionnelle	Non	En cours	Société Française de Radiologie
Abdomen	Chirurgie digestive	Oui	Non	Cancers digestifs et Covid-19 Société Française de Chirurgie Oncologique Fédération de chirurgie viscérale et digestive Société Française d'Endoscopie Digestive
	Gastroentérologie et Endoscopie digestive	Oui	Non	
	Urologie	Oui	En cours	Comité de Cancérologie de l'Association Française d'Urologie
	Transplantation	Oui	En cours	Agence de Biomédecine Transplantation rénale
	Gynécologie	Oui	Non	Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français Obstétrique
Orthopédie et plastique	Orthopédie	Oui	Oui	Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique Orthopédie pédiatrique
	Plastique esthétique et reconstructrice	Oui	En cours	Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique